



* Número de Registro: Q-11069-002

LINCOMICINA PREMIX

• Premezcla Medicada •



INDICACIONES:

Para el tratamiento de procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la lincomicina.

Porcinos: Disentería, Neumonía enzoótica, Ileítis (*Lawsonia intracelullaris*).

Aves: control de enteris necrótica y micoplasmosis.

ESPECIES:

*Porcinos y aves (pollos de engorda).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.


DOSIS:

En **porcinos** tratamiento de neumonia enzoótica: 1 a 2 kg de Lincomicina Premix / tonelada de alimento, equivalente de 110 a 220 ppm.

-Disenteria porcina: 1 kg de Lincomicina Premix / tonelada de alimento, equivalente a 110 ppm.

Ileítis: 0.4 a 1 kg de Lincomicina Premix /equivalente de 44 a 110 ppm.

En **aves** control de Enteritis necrótica: 18 a 36 g de Lincomicina Premix / tonelada de alimento equivalente de 2 a 4 ppm.



FÓRMULA:

Cada 1000 g contiene:

Lincomicina.....	110.0 g
Excipiente, c.b.p.....	1000 g

TIEMPO DE RETIRO:

*No se administre 6 días antes del sacrificio de los porcinos destinados para consumo humano.

*En aves el tiempo de retiro es de 2 días.

ADVERTENCIAS:

*No se administre este producto en aves para producción de huevo destinado a consumo humano.

*No se administre este producto en aves que se destinen a la reproducción.

* Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

* Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

Presentacion:

25 kg

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PARA
MEDICINA VETERINARIA**