



FÓRMULA:

Cada 1 mL contiene:

Ivermectina 10.0 mg
Vehículo c.b.p. 1.0 mL

PRESENTACIÓN:

10, 20, 50 mL, 100 mL y 250 mL.

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PARA
MEDICINA VETERINARIA**

IVERVET INY 1%

• Solución Inyectable •

* Número de Registro: Q-11069-021 *

* Número de Registro: MV-1055 *

INDICACIONES:

IverVet Iny 1% es una solución inyectable estéril, efectiva para el control y tratamiento contra parásitos internos en estados larvarios y adultos, así como los parásitos externos en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y caninos con una sola aplicación; presentando un amplio margen de seguridad en todas las especies antes mencionadas. **IverVet Iny 1%**, está indicado para el tratamiento contra los siguientes parásitos: **Parásitos gastrointestinales:** *Ascaris summ*, *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum spp*, *Strongyloides ransomi* y *Ancylostoma spp*. **Parásitos pulmonares:** *Metastrongylus spp*. **Parásitos del riñón:** *Stephanurus dentatus*, *Trichuris suis*. **Piojos:** *Haematopinus suis*. **Ácaros de la sarna:** *Sarcoptes scabiei var. suis*, *Otodectes cynotis*, *Sarcoptes scabiei*, *Cheyletiella yasguri*, *Cheyletiella parasitovorax*, *Cheyletiella blakei*, *Pneumonyssus caninum*.

ESPECIES:

Bovinos productores de carne, ovinos de engorda, caprinos de engorda, porcinos y caninos.

DOSIS:

- **Bovinos productores de carne, ovinos de engorda y caprinos de engorda:** 1 mL por cada 50 kg de peso vivo (200 mg/kg de peso vivo), administración única.
- **Porcinos:** 1 mL por cada 33 kg de peso vivo (300 mg/kg de peso vivo), administración única.
- **Caninos:** 0.1 mL a 0.15 mL por cada 5 kg de peso vivo (200 a 300 mg/kg de peso vivo), administración única.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- Subcutánea exclusivamente.

TIEMPO DE RETIRO:

- No administrar este producto 35 días antes del sacrificio de los bovinos, caprinos y ovinos destinados al consumo humano.
- No administrar este producto 18 días antes del sacrificio de los porcinos destinados al consumo humano.

ADVERTENCIAS:

- No utilizar este producto en hembras en producción de leche para consumo humano.
- No administrar por vía intravenosa.
- No administrar 28 días antes del parto.
- No administrar en perros menores de 6 semanas de edad.
- No administrar en perros Collie, Sheltie, Viejo Pastor Inglés, Ovejero Australiano, Pastor de Shetland y demás perros de pastoreo.
- Este producto no debe ser usado para el tratamiento de infecciones por garrapatas *Boophilus spp*.
- Los frascos vacíos deben destruirse de forma segura (incinerándolos o enterrándolos) ya que la Ivermectina libre puede afectar de manera adversa a peces u otros organismos acuáticos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y/o animales domésticos.
- Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.