

POLVO SOLUBLE

Sutrivetsa 600GI

INDICACIONES:

SUTRIVETSA 600 esta recomendado en el tratamiento de infecciones respiratorias y/o digestivas agudas en pollos de engorda y porcinos, así como de infecciones del tracto urogenital, salmonelosis, paratifoidea, shigellosis. Cuando la terapia antibacteriana está indicada para diarrea por *Escherichia coli* enterotoxigénica debe acompañarse con una terapia de reemplazo de fluidos y electrolitos. En el caso de pollos de engorda y porcinos se recomienda adicionar electrolitos en el agua de bebida. Dentro de los organismos comúnmente sensibles a la combinación del SUTRIVETSA 600 se encuentran *cocos gram positivos: Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus pneumoniae. Bacilos gram negativos tales como, Haemophilus spp, Escherichia coli, Citrobacter spp, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella spp, Shigella spp Pasteurella spp. Pseudomonas spp.*

ESPECIES: Pollos de engorda y porcinos.

DOSIS:

Pollos de engorda y porcinos: 200 a 400 g de SUTRIVETSA 600 por cada 1000 L de agua de bebida (equivalente a 24 mg de activo por kg de peso vivo), durante 5 a 7 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, disuelto en el agua de bebida.

TIEMPO DE RETIRO

- No administrar este producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños y/o animales domésticos.
- Conservar en lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.

Presentaciones:

1 kg y 25 kg.

FÓRMULA:

Cada 100 g contiene:

Sulfacloropiradizina sódica.....	50.0 g
Trimetoprim.....	10.0 g
Excipiente, c.b.p.....	100.0 g

Producto de uso exclusivo en
medicina veterinaria.

