




FÓRMULA:

Cada 1 mL contiene:

Tilmicosina fosfato	200.0 mg
Florfenicol.....	100.0 mg
Dipirona sódica.....	200.0 mg
Bromhexina clorhidrato.....	3.0 mg
Vehículo c.b.p.....	1.0 mL

PRESENTACIÓN:

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL y 250 mL.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PARA
MEDICINA VETERINARIA

TILMIFLOX GOLD

• Solución Inyectable •

* Número de Registro: Q-11069-031 *

* Número de Registro: MX957-07-01-13594 *

INDICACIONES:

Tilmiflox Gold es una combinación de antibióticos de amplio espectro adicionado con un expectorante y antipirético.

En los bovinos de carne, terneros y ganado lechero en periodo seco:

Indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, diarrea en terneros, pododermatitis, queratitis, infecciones del tracto genital e infecciones en general, causadas por: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Histophilus somni*, *Corynebacterium pyogenes*, *E. coli*, entre otras, así como las infecciones asociadas o complicadas por *Mycoplasma spp.*

Porcinos: Esta indicado para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio como: pleuropneumonía, pasteurelosis, neumonia enzoótica, rinitis atrófica y en diarreas por *E. coli* e infecciones asociadas o complicadas con *M. hyopneumoniae*.

ESPECIES:

Bovinos y porcinos.

DOSIS:

- **Bovinos:** 1 mL de **Tilmiflox Gold** por cada 15 kg de peso vivo, realizar una segunda aplicación del producto a las 48 hrs.
- **Porcinos:** 1 mL de **Tilmiflox Gold** por cada 30 kg de peso vivo, realizar una segunda aplicación del producto a las 48 hrs.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

TIEMPO DE RETIRO:

- No administrar 38 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- En animales destinados a la producción láctea, no administre el producto 5 días antes del parto y nunca lo administre durante la etapa de producción láctea.

ADVERTENCIAS:

- Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz.
- No se deje al alcance de los niños y/o animales domésticos.
- No administrar más de 20 mL en el mismo sitio de aplicación.
- Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria